



Bodybox, Spirometrie en Diffusietest met medicatie

In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen voor een uitgebreid longfunctie-onderzoek. Hierbij wordt het functioneren van uw longen onderzocht zowel voor als na inhalatie van luchtwegverwijdende medicatie. Deze folder geeft informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat van u verwacht wordt.

Vorbereiding

- In verband met het onderzoek moet u **stoppen** met het gebruiken van uw **longmedicatie**, zie het schema 'Stoppen met medicatie'. Overige medicatie kunt u blijven gebruiken.
- Het is verstandig om vanaf twee uur voor het onderzoek geen zware inspanning te verrichten en tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat u rustig en ontspannen aan het onderzoek kan beginnen.
- Belangrijk is dat u vanaf twee uur voor het afgesproken tijdstip **niet rookt**.
- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Het onderzoek

- Voorafgaand aan het onderzoek worden uw lengte en gewicht gemeten.
- U neemt plaats op een stoel in een doorzichtige cabine waarvan de deur open blijft.
- Hierna krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus. Via het mondstuk kunt u normaal verder ademen.
- Vervolgens voert u een aantal ademhalingstesten uit.
- Voor het vervolg van het onderzoek wordt de deur van de cabine enkele minuten gesloten, deze kan ten allen tijde van binnenuit worden geopend.
- Hierna krijgt u luchtwegverwijdende medicatie. Na 15-30 minuten inwerktijd zal het bovenstaande onderzoek herhaald worden.
- Tevens zal de snelheid worden gemeten waarmee uw longen zuurstof doorgeven aan uw bloed. Hiervoor wordt u gevraagd om uw adem tien tellen vast te houden.
- Naar aanleiding van de uitkomsten kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren. Indien dit voor u van toepassing is zal de longfunctieanalist dit met u bespreken.

Het gehele onderzoek is pijnloos en duurt 45-60 minuten.



Uitslag van het onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om dit door te geven. In uw plaats helpen we graag een andere patiënt.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Longziekten in Apeldoorn of Longgeneeskunde in Zutphen.

Bereikbaarheid

Gelre Apeldoorn

Polikliniek Longziekten
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur
Tel: 055 – 581 84 10

Gelre Zutphen

Polikliniek Longgeneeskunde
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur
Tel: 0575 – 592 810

Aanmelden voor het onderzoek

Gelre Apeldoorn

Polikliniek Longziekten route 158

Gelre Zutphen

Biometrie afdeling route 21

Voor meer informatie

www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie



Stoppen met medicatie

6 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

12 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Atrovent	Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium

36 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Aerivo	Salmeterol + Fluticason
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoleer Eashaler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuari	Aclidinium + Formoterol
DueResp Spiromax	Formoterol + Fluticason
Eklira Genuair	Aclidinium
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclometason
Oxis	Formoterol
Semprex	Acrivastine
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Singulair	Montelukast
Symbicort	Formoterol + Budesonide

Patiënteninformatie wordt met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie.

U kunt aan deze uitgave geen rechten ontlenen.

© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl



48 uur van te voren (2 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Daxas	Roflumilast, actieve metaboliet
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasonfuroaat / Vilanterol
Striverdi	Oladeterol
Theolari Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline

168 uur van te voren (7 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Anoro	Umeclidinium / Vilanterol
Incruse Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium / Olodaterol
Spiriva	Tiotropium
Tiotrus Zonda	Tiotropium
Trimbow	Beclometasondipropionaat / Formoterolfumaraatdihydraat / Glycopyrronium
Trelegy Ellipta	Fluticason / Vilanterol / Umeclidinium
Ultibro	Indacaterol / Glycopyrronium
Xoterna	Indacaterol / Glycopyrronium

Het is **niet** nodig met de volgende medicatie te stoppen:
Qvar, Flixotide, Pulmicort en Alvesco.

Indien het stoppen van uw luchtwegmedicatie niet mogelijk is, meldt u dan bij aanvang van het onderzoek welke medicijnen u wel gebruikt heeft.