



Histamineprovocatietest

In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen voor een histamineprovocatietest. Bij dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de longen gemeten. Deze folder geeft informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat van u verwacht wordt.

Vorbereiding

- In verband met het onderzoek moet u **stoppen** met het gebruiken van uw **long- en anti allergie medicatie**, zie het bijgevoegde schema 'Stoppen met medicatie'. Overige medicatie kunt u blijven gebruiken.
- Het is verstandig om vanaf twee uur voor het onderzoek geen zware inspanning te verrichten en tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat u rustig en ontspannen aan het onderzoek kan beginnen.
- Belangrijk is dat u vanaf twee uur voor het afgesproken tijdstip **niet rookt**.
- U hoeft **niet** nuchter te zijn voor dit onderzoek.
- Bent u momenteel bezig met een antibiotica- of prednisonkuur voor een **luchtweginfectie**? Neemt u dan **contact** met ons op.

Het onderzoek

- U ademt, via verneveling, in oplopende dosering een histamine oplossing in.
- Na elke verneveling wordt gemeten hoe uw luchtwegen hierop reageren.
- Gedurende dit onderzoek kunt u gaan hoesten, kortademig en/of benauwd worden.
- Bij een bepaalde daling van uw longfunctie of bij heftige toename van klachten wordt de provocatie gestaakt en krijgt u luchtwegverwijdende medicatie.
- Na het inwerken van deze medicatie wordt het herstel van uw longfunctie gemeten.
- Na het onderzoek kunt u een lichte keelpijn, hoofdpijn, heesheid of prikkelhoest ervaren. Deze klachten zullen vanzelf overgaan.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.



Uitslag van het onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om dit door te geven. In uw plaats helpen we graag een andere patiënt.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Longziekten in Apeldoorn of Longgeneeskunde in Zutphen.

Bereikbaarheid

Gelre Apeldoorn

Polikliniek Longziekten
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur
Tel: 055 – 581 84 10

Gelre Zutphen

Polikliniek Longgeneeskunde
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur
Tel: 0575 – 592 810

Aanmelden voor het onderzoek

Gelre Apeldoorn

Polikliniek Longziekten route 158

Gelre Zutphen

Biometrie afdeling route 21

Voor meer informatie

www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie_1



Stoppen met medicatie

6 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

12 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium

24 uur van te voren (1 dag)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Sandomigran	Pizotifeen (anti-migraine)

36 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Aerivo	Salmeterol + Fluticason
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoleer Eashaler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuari	Aclidinium + Formoterol
DueResp Spiromax	Formoterol + Fluticason
Elpenhaler	Salbutamol + Fluticason
Eklira Genuair	Aclidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclometason
Oxis	Formoterol
Semprex	Acrivastine
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Singulair	Montelukast
Symbicort	Formoterol + Budesonide

48 uur van te voren (2 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Daxas	Roflumilast, actieve metabooliet
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasonfuroaat / Vilanterol
Striverdi	Oladeterol
Theolari Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline



72 uur van te voren (3 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Arius	Desloratadine
Allerfre	Loratadine
Cinnarizine	Cinnarizine
Claritine	Loratadine
Cyclizine	Cyclizine
Emesafene	Meclozine / Pyridoxine
Fenistil	
Hydroxyzine	Hydroxyzine
Kestine	Ebastine
Ketotifen	Ketotifen
Mizollen	Mizolastine
Nedeltran	Alimenazine
Prevalin allerstop	Cetirizine
Primatour	Chloorcyclizine / Cinnarizine
Promethazine	Promethazine
Reactine	Cetirizine
Rupafine	Rupatadine
Semprex	Acrivastine
Suprimal	Meclozine
Tavegyl	Clemastine
Telfast	Fexofenadine
Toplexil	Oxomemazine
Xyzal	Levocetirizine
Zaditen	Ketotifen
Zyrtec	Cetirizine

168 uur van te voren (7 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Anoro	Umeclidinium / Vilanterol
Incruse Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium / Olodaterol
Spiriva	Tiotropium
Tiotrus Zonda	Tiotropium
Trimbow	Beclometasondipropionaat / Formoterolfumaraatdihydraat / Glycopyrronium
Trelegy Ellipta	Fluticason / Vilanterol / Umeclidinium
Ultibro	Indacaterol / Glycopyrronium
Xoterna	Indacaterol / Glycopyrronium

Het is **niet** nodig met de volgende medicatie te stoppen:
Qvar, Flixotide, Pulmicort en Alvesco.

Indien het stoppen van uw luchtwegmedicatie niet mogelijk is, meldt u dan bij aanvang van het onderzoek welke medicijnen u wel gebruikt heeft.