



M.Crohn/Colitis ulcerosa patiënten met infliximab (Inflectra®)

Informatie patiënten en ouders

Infliximab (Inflectra) is een geneesmiddel dat een ontstekingsproces onderbreekt. Infliximab is een antilichaam en bestaat deels uit mens- en deels uit muizen-eiwitstukjes. Het bindt aan een zeer specifiek eiwit: het zogenaamde Tumor Necrosis Factor-alpha. TNF speelt een belangrijke rol bij ontstekingsprocessen bij ondermeer ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en andere auto-immuunaandoeningen. Hierdoor voorkomt anti-TNF de schadelijke effecten van TNF. Infliximab wordt als oplossing toegediend via een infuus in de ader in de arm/hand of elders gedurende een periode van twee uur. Nadat het infuus is toegediend, worden nog gedurende circa twee uur de bloeddruk en de pols gemeten.

Mogelijke bijwerkingen

Net als alle geneesmiddelen kan infliximab bijwerkingen hebben. De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen. Sommige patiënten die behandeld werden met infliximab kregen allergische reacties binnen twee uren na de toediening van het geneesmiddel. Deze waren in het algemeen mild tot matig, en soms, in zeldzame gevallen ernstiger. De symptomen van zulke reactie zijn meestal huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk. Deze symptomen zullen het meest optreden bij de eerste of de tweede toediening van het geneesmiddel. Andere bijwerkingen kunnen veel later optreden.

Raadpleeg de arts zo snel mogelijk wanneer jij/u iets van het volgende merkt:

- Tekenen van infectie
- Heesheid, hoesten of Kortademigheid
- Pijn bij plassen of heel vaak kleine beetjes plassen
- Een licht gevoel in het hoofd
- Vermoeidheid
- Koorts
- Huiduitslag of Jeuk.

Bij de behandeling kunnen nog enkele andere bijwerkingen optreden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat jij/uw kind gemakkelijker een infectie oploopt (m.n. virale maar ook bacteriële infecties van luchtwegen, huiduitslag, buikgriep). Bovendien kan een tuberculose-besmetting die in het verleden heeft plaatsgevonden terugkomen, doorgaans als deze niet goed behandeld is of ongemerkt is verlopen. Hierop is bij jou/uw zoon/dochter voor het starten van de behandeling goed naar gekeken. Andere



bijwerkingen zijn moeizame ontlasting, bloedarmoede, ontsteking van de lever, bloeding in het maagdarmkanaal, bloedneus, spierpijn, pijnlijke gewrichten, oogontsteking, blaasontsteking en vermoeidheid).

In heel zeldzame gevallen kan er lymfklierkanker of leukemie optreden.

Wanneer mag infliximab niet gebruikt worden?

Het gebruik van infliximab wordt afgeraden:

- Indien je/uw zoon/dochter een voorgeschiedenis hebt/heeft van ernstige overgevoeligheid of allergie voor een van de componenten van het product
- Of een allergie hebt voor muis (muis- en rat-) eiwitten
- Of bij een infectie of abscessen.

Als u twijfelt of uw kind een infectie heeft, dient u te overleggen met uw arts. In geval van een infectie moet het toedienen van het infuus tenminste 2 weken worden uitgesteld.

Indien er een allergische reactie optreedt tijdens of vlak na infusie zijn er verschillende acties mogelijk:

- Treden de symptomen tijdens de infusie op, dan kan de arts de snelheid van de infusie verminderen, zodat het langer duurt voordat u het geneesmiddel volledig hebt binnen gekregen.
- De arts kan de toediening van het geneesmiddel ook stopzetten totdat de symptomen verdwijnen en dan opnieuw met de toediening beginnen.
- De arts kan de symptomen voorts behandelen met andere geneesmiddelen (paracetamol, medicijnen tegen allergie, corticosteroïden luchtwegverwijders en/of adrenaline).

Meestal kan je/uw kind nog wel infliximab krijgen, maar dan wordt tevoren een medicijn gegeven om dit te voorkomen; ook al treden er symptomen op. De arts kan echter in sommige gevallen besluiten dat het het beste is geen infliximab meer toe te dienen.

Operaties

Licht de arts in wanneer je/uw zoon/dochter geopereerd moet worden. Indien er een geplande operatie plaatsvindt dient het laatste infliximab infuus uiterlijk 2 weken voor de geplande operatie te zijn toegediend. Infliximab kan minimaal 2 weken na de operatie worden hervat indien er geen tekenen van infecties zijn.

Gebruik van andere geneesmiddelen

Licht de arts in wanneer je/uw zoon/dochter andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk is. Er is overigens niets bekend over de mogelijke interacties van infliximab met andere geneesmiddelen.

Bij twijfel altijd overleggen met de behandelend arts.